

Trigo Crac Baer

Amplio rango de adaptación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


HÁBITO DE CRECIMIENTO	Alternativo
TIPO DE CRECIMIENTO	Semirastrero
ALTURA	110 cm
ESPIGA	Sin barbas
GRANO	Blanco

ZONA DE ADAPTACIÓN

EPOCA DE SIEMBRA

ÉPOCA DE SIEMBRA:	Abril - Julio
ZONA ADAPTACIÓN	VIII to X region
DOSIS DE SEMILLA	120 - 160 Kg/ha
DOSIS CERO LABRANZA	140 - 180 Kg/ha
TOLERANCIA ACIDEZ	Buena a muy buena


RESISTENCIA A ENFERMEDADES



TOLERANTE SEPTORIA



RESISTENTE POLVILLO ESTIRADO



RESISTENTE POLVILLO COLORADO

CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES

FISICA

COLOR DE GRANO	Blanco
PESO DE 1000 GRANOS	45.0 g
PESO HECTOLITRO	81 - 83 kg/hL

CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES

QUIMICA

PROTEÍNA	11 % MS / 9.5 % MH(14%)
GLUTEN HÚMEDO	28 - 32 %
SEDIMENTACIÓN	40 cc